



Błotniak łąkowy

przyroda i rolnictwo



Samiec błotniaka łąkowego. Fot. Marcin Karetta



Samica błotniaka łąkowego. Fot. Reint Jakob Schut



Pisklęta w 3 tygodniu życia. Fot. Dominik Krupiński

Błotniak łąkowy jest ptakiem drapieżnym związanym z terenami rolniczymi. Gnieździ się na ziemi pod osłoną wyższych roślin - trzciny i turzyc lub zbóż ozimych i rzepaku. Poluje na łąkach, pastwiskach oraz polach. Jest gatunkiem nielicznym i zagrożonym wyginięciem, dlatego też został wpisany do załącznika I (gatunki priorytetowe) Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.

Jako ptak krajobrazu rolniczego jest szczególnie narażony na zmiany zachodzące w rolnictwie. Intensyfikacja produkcji rolnej oraz likwidacja miedz, ugorów i zakrzaczeń niekorzystnie wpływa na jego liczebność. Lęgi na polach zagrożone są z powodu mechanicznego zbioru. Młode ptaki wylatują z gniazd od połowy lipca, a więc w czasie rozpoczynania żniw. W latach, kiedy zbiór zbóż zaczyna się wcześniej, duża część lęgów jest nieumyślnie niszczone przez kombajny.

Jak możesz pomóc?

Jeżeli znajdziesz gniazdo błotniaka łąkowego, a pisklęta są małe, pokryte białym puchem pisklęcym:

- Wstrzymaj koszenie do momentu wylotu młodych z gniazda.
- Jeżeli nie jest to możliwe, w dniu koszenia zabierz pisklęta z gniazda, a następnie zaznacz (palikami) tan wokół gniazda, który nie zostanie skoszony przez kombajnista. Należy pozostawić fragment o powierzchni 5 x 5 m. Lęgi warto zabezpieczyć dodatkowo przed lisami, psami i kotami grodząc gniazdo metalową siatką.

Gdy pisklęta są starsze (opierzone) i prawie lotne:

- Zabierz pisklęta z gniazda na czas koszenia zboża, a po pracach polowych zostaw ptaki na ściernisku w pobliżu miejsca, w którym znajdowało się gniazdo.
- Ptaki połóż w niewielkim dołku. Ubarwienie młodych (rdzawobrazowe) powoduje, że są one mało widoczne na tle ścierniska. Wokół dołka zostaw trochę słomy, aby pisklęta miały możliwość schronienia się przed słońcem. Podczas prasowania słomy omiń miejsce, w którym zostawione zostały pisklęta.

Pisklęta przenieść można również na sąsiednie pole i pozostawić je w wydeptanym w zbożu, niewielkim okręgu. Musimy mieć jednak pewność, że zboże nie zostanie skoszone do momentu osiągnięcia przez ptaki lotności!



Wiele lęgów jest nieumyślnie niszczone podczas żniw. Fot. Dominik Krupiński



Młodzież



Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Ochrana dravcov na Slovensku
Svätoplukova 1
821 08 Bratislava
tel./fax: +421 2 555 734 40
dravce@dravce.sk
www.dravce.sk



Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”
08-110 Siedlce,
ul. Jagielly 10
tel./fax: 025 632 77 78
biuro@bocian.org.pl
www.bocian.org.pl